A.F. Viognier

Vass2R10s391-395

Collection Vassal-Montpellier

0mtp1485

See real a distriction of the second of the

3498

0mtp1485

A.F. Viognier

Vass2R10s391-395

CR 22/07 x6



Formulaire de description 4/8 (entre nouaison et véraison)

Année : 2000 Code cépage : O

Code introduction: 1485

Observateur

Nom introduction: AF de Viognier

Emplacement : 28 10 13 31-335

Feuille adulte

oiv 065 taille: très petite 1 - petite 3 - moyenne (5)- grande 7 - très grande 9 oiv 067 forme du limbe : cordiforme 1 - cunéiforme 2 - pentagonale 3) - orbiculaire 4 - réniforme 5.

oiv 068 nombre de lobes : seuille entière 1 - trois 2 - cinq 3 - sept 4 - plus de sept 5.

oiv 069 couleur face supérieure limbe : vert clair 3 - vert moyen 5 - vert foncé 7. oiv 070 pigmentation anthocyanique des nervures, face supérieure : nulle D- point pétiolaire rouge 2 - rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4.

oiv 071 pigmentation anthocyanique nervures, face inférieure : nulle ? - point pétiolaire rouge 2 - rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4.

oiv 074 profil : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 tourmenté 5

oiv 073 ondulation limbe (entre nervures I ou II) : absent - présente 9.

oiv 072 gaufrure limbe (dépressions entre nervures II ou III) : absente 9- présente 9

oiv 075 cloqure face supérieure limbe (relief entre nervures de dernier ordre) nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 3 - forte 7 - très forte 9.

oiv 084 densité poils couchés entre nervures face inférieure

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne/5) - forte 7 - très forte 9.

oiv 085 densité poils dressés entre nervures face inférieure

nulle ou très saible 1) - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 086 densité poils couchés des nervures face inférieure :

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 8 - forte 7 - très forte 9.

oiv 087 densité poils dressés des nervures face inférieure :

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 088 villosité couchée des nervures principales face supérieure : absente 1 présente 9. oiv 089 villosité dressée des nervures principales face supérieure : absente 1) - présente 9

Pétiole

oiv 090 densité poils couchés : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 091 densité poils dressés : nulle ou très faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 093 longueur du pétiole p/r nervure médiane : beaucoup plus court 1 - plus court 3 - égal 5 - plus long 7 - beaucoup plus long 9.

[sinus pétiolaire : ouverture = 1-2)3-4-5-6 / forme = U-accol. W dent = oui-non / dégarni parfois-oui]

oiv 501 taux de nouaison (7 à 14 j après floraison) : très faible (<10%) 1 - faible (11-30%) 3 moyen (31-50%) 5 - élevé (51-70%) 7 - très élevé (>80%) 9.

Vassal:

Densité poils couchés limbe face supérieure :

nulle ou très faible 1) - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Densité poils dressés limbe face supérieure :

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 000-06 Couleur du pétiole : vert 3 - partiellement colore 3 - coloré 1